

Climatic Requirement:

Soil: Well-suited for loam to clay-loam soils with good organic matter. Optimum soil pH: 5.5-7.5. Avoid highly saline or alkaline soils.
Climate: Prefers warm and humid conditions. Requires continuous moisture from transplanting to flowering. Sensitive to drought at tillering and panicle initiation stages.

Sowing / Nursery Time: Kharif Season: May – July

Crop Duration: 145-150 days **Seed Rate:** 4-5 kg per acre (nursery)

Grain Type :

Long Slender , Strong aromatic basmati variety.

Nursery Management:

Prepare raised nursery beds with fine tilth. Maintain proper moisture and weed-free nursery. Seedlings ready in 25-30 days.

Transplanting & Spacing:

25-30 days old seedlings. 20 cm × 15 cm spacing. 1-2 seedlings per hill.

Land Preparation:

Deep ploughing followed by puddling. Maintain 2-3 cm water at transplanting. Level field well.

Fertilizer Dose (per acre):

Urea	SSP	MOP:
80-100 kg (37-46 kg N)	80-100 kg (13-16 kg P ₂ O ₅)	25-30 kg (15-18 kg K ₂ O)
Split Application of Nitrogen: Basal: 1/3 Tillering: 1/3 Panicle Initiation: 1/3		

Irrigation Schedule:

• Maintain 2-3 cm water after transplanting. Maintain 3-5 cm water till flowering. Drain water 10-12 days before harvest.

Weed Control:

• Pre-emergence: Pretilachlor @ 600 ml/acre, 3-5 DAT.
• Post-emergence: Bispyribac Sodium @ 80-120 ml/acre at 20-25 DAT.
• Hand weeding at 30 DAT if needed.

Pest & Disease Management:**Pests:**

• Stem Borer: Chlorantraniliprole 0.3 ml/l.
• Leaf Folder: Emamectin Benzoate 0.4 g/l.
• BPH: Dinotefuran 40-60 g/acre or Imidacloprid 0.5 ml/l.

Diseases:

• Blast: Tricyclazole 0.6 g/l.
• Sheath Blight: Validamycin or Hexaconazole.
• BLB: Copper Oxychloride + Streptocycline.

Maturity Indicators:

• Panicles turn golden yellow. Grains become firm. Grain moisture 20-22%.

जलवायु आवश्यकता:

मिट्टी: अच्छे कार्बनिक पदार्थों के साथ दोमट से चिकनी-दोमट मिट्टी के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। आदर्श मिट्टी पीएच: 5.5-7.5। अत्यधिक खारी या क्षारीय मिट्टी से बचें।
जलवायु: गर्म और आर्द्र परिस्थितियों को प्राथमिकता देता है। रोपाईं से लेकर फूल आने तक निरंतर नमी की आवश्यकता होती है। जुताई और पुष्पगुच्छ दीक्षा चरणों में सूखे के प्रति संवेदनशील।

बुवाई का समय: खरीफ का मौसम: मई-जुलाई

फसल की अवधि: 145-150 दिन **बीज दर:** 4-5 किग्रा प्रति एकड़ (नर्सरी)

अनाज का प्रकार:

लंबे पतले, मजबूत सुगंधित बासमती किस्म।

नर्सरी प्रबंधन:

ठीक ढिल्ल के साथ उठाए गए नर्सरी बेड तैयार करें। उचित नमी और खरपतवार मुक्त नर्सरी बनाए रखें। 25-30 दिनों में अंकुर तैयार हो जाते हैं।

रोपाई और स्पेसिंग:

25-30 दिन पुराने अंकुर। 20 सेमी × 15 सेमी की दूरी। प्रति पहाड़ी 1-2 अंकुर।

भूमि की तैयारी:

गहरी जुताई के बाद पोखर चलाना। रोपाईं के समय 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। स्तर क्षेत्र अच्छी तरह से।

उर्वरक खुराक (प्रति एकड़):

यूरिया 80-100 किग्रा. (37-46 किग्रा. N), एसएसपी 80-100 किग्रा. (13-16 किग्रा. P₂O₅)

एमओपी 25-30 किग्रा. (15-18 किग्रा. K₂O)

नाइट्रोजन का विभाजित अनुप्रयोग: बेसल- 1/3, टिलरिंग: 1/3, पुष्पगुच्छ दीक्षा: 1/3

सिंचाई अनुसूची:

रोपाई के बाद 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। फूल आने तक 3-5 सेमी पानी बनाए रखें। कटाई से 10-12 दिन पहले पानी निकाल दें।

खरपतवार नियंत्रण:

• पूर्व-उद्भव: प्रीटिलाक्लोर @ 600 मिली/एकड़, 3-5 दिन रोपाईं के बाद।
• उद्भव के बाद: बिस्पीरिबैक सोडियम @ 80-120 मिली/एकड़ 20-25 दिन रोपाईं के बाद।
• 30 DAT पर हाथ से निराई।

कीट एवं रोग प्रबंधन:**कीट:**

• स्टेम बोरर: क्लोरान्त्रानिलिप्रोल 0.3 मिली/लीटर।
• लीफ फोल्डर: इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम/लीटर।
• बीपीएच: डिनोटेफ्यूरान 40-60 ग्राम/एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली/लीटर।

रोग:

• ब्लैस्ट: ट्राइसाइक्लाज़ोल 0.6 ग्राम/लीटर।
• शीथ ब्लाइट: वैलिडामाइन या हेक्साकोनाज़ोल।
• बीएलबी: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड + स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।

परिपक्वता संकेतक:

• पुष्पगुच्छ सुनहरे पीले हो जाते हैं। अनाज दृढ़ हो जाते हैं। अनाज की नमी 20-22%।

The recommended package of practice is based on trials done at company's research stations. As a result of varied soil type, water, weather conditions and crop rotations, the yield of this variety may vary. As method of seed sowing and usage is not in our control, hence, only seed quality can be ensured. Consult the nearest SAU/ICAR Research Stations or your local State Agriculture Officer for guidance in growing good crop.

अभ्यास का अनुसंधान पैकेज कंपनी के अनुसंधान स्टेशनों पर किए गए परीक्षणों पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के प्रकार, पानी, मौसम की स्थिति और फसल चक्र के परिणामस्वरूप, इस किस्म की उपज भिन्न हो सकती है। चूंकि बीज बोने की विधि और उपयोग हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए केवल बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। अच्छी फसल उगाने में मार्गदर्शन के लिए निकटतम एसयू/आईसीआर अनुसंधान स्टेशनों या अपने स्थानीय राज्य कृषि अधिकारी से परामर्श करें।

ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ:

ਮਿੱਟੀ: ਚੰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਣੀ-ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਮਿੱਟੀ ਪੀਐਚ: 5.5-7.5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਜਲਵਾਯੂ: ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ : ਮਈ-ਜੁਲਾਈ
ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ: 145-150 ਦਿਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 4-5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਪਨੀਰੀ)

ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ :

ਲੰਮੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਖੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪਨੀਰੀ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਲਾ:

25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ x 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। 1-2 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਾੜੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:

ਡੂੰਘੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਡਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰੋ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ):

ਯੂਰੀਆ: 80-100 ਕਿਲੋ (37-46 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ), ਐਸਐਸਪੀ: 80-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (13-16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ P ₂ O ₅),
ਐਮ. ਓ. ਪੀ.: 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (15-18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇ.ਓ)
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਬੇਸਲ: 1/3 ਟਿਲਰਿੰਗ: 1/3 ਪੈਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1/3

ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ:

• ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਉ।

ਖਰਤਪਰਵਾਰ:

- ਪੂਰਵ-ਉਭਰਨ: ਪ੍ਰੀਟੀਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.।
- ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਬਿਸਪਾਈਰੀਥੈਕ ਸੋਡੀਅਮ @ 80-120 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਤੇ.।
- ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣਾ 30 ਡੀ.ਏ.ਟੀ.।

ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ:

- ਤਣੇ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ: ਕਲੋਰੋਟਰਾਨੀਲੀਪਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
- ਪੱਤਾ ਦਾ ਫੋਲਡਰ: ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀ.
- ਬੀ.ਪੀ.ਐਚ.: ਡਾਈਨੋਟੋਫਰਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ:
- ਧਮਾਕਾ: ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀ.
- ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ: ਵੈਲੀਡਾਮਾਈਸਿਨ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਕੋਨਾਜੋਲ.
- ਬੀਐਲਬੀ: ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸੂਚਕ:

• ਪੈਨਿਕਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਮੀ 20-22%।

ਹਵਾਮਾਨਾਚੀ ਆਵੇਸ਼ਕਤਾ:

ਮਾਤੀ: ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਤੇ ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਯਾ ਚਾਂਗਲ੍ਯਾ ਸੇਂਟ੍ਰਿਯ ਪਦਾਰਥਾਂਸਹ ਚਿਕਨਮਾਤੀਸਾਠੀ ਯੋਗ੍ਯ ਅਹੇ. ਝੁਝਟਮ ਮਾਤੀਚਾ ਪੀਏਚ: 5.5-7.5. ਜਾਸਟ ਖਾਟ ਚਿਕਾ ਅਲਕਥਮੀ ਮਾਤੀ ਠਾਲਾ.

ਹਵਾਮਾਨ: 3ਬਦਾਰ ਆਠਿ ਦਮਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਲਾ ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯ ਵੇਦੇ. ਲਾਕਠੀਪਾਸੂਨ ਤੇ ਫੁਲੇ ਯੋਘ੍ਯਾਪਰੰਟ ਸਰਤ ਠਾਲਾ ਆਵੇਸ਼ਕ ਅਸਾਤੋ. ਮਸ਼ਾਗਟ ਆਠਿ ਪੈਨਿਕਲ ਆਰੰਮ ਅਵਸਥੇਟ ਟੁਠਕਾਲਾਸਾਠੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ.

ਪੇਟਰੀਚੀ ਵੇਲ: ਖ਼ਰੀਫ ਹੁੰਗਾਮ: ਮੇ-ਜੁਲੈ
ਪੀਕ ਕਾਲਾਵਧੀ: 145-150 ਦਿਵਸ ਬਿਯਾਧੇ ਦਰ: 4-5 ਕਿਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ (ਨਰੰਦੀ)

ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਪ੍ਰਕਾਰ :

ਲਾਂਬ ਸਤਪਾਟਲ , ਠੀਕ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਤੀਚੀ .

ਨਰੰਦੀ ਕ੍ਯਵਸਥਾਪਨ:

• ਭਾਰੀਕ ਟਿਲ੍ਯ ਅਸਲੇਲੇ ਤੰਚ ਨਰੰਦੀ ਬੇਡ ਟਯਾਰ ਕਰਾ. ਯੋਗ੍ਯ ਠਾਲਾ ਆਠਿ ਟਠਮੁਕ ਟੋਪਵਾਟਿਕਾ ਠੇਵਾ. 25-30 ਦਿਵਸਾਂਟ ਰੋਪੇ ਟਯਾਰ ਹੋਤਾਟ.

ਰੋਪੇ ਆਠਿ ਅੰਤਰ:

25-30 ਦਿਵਸਾਂਚੀ ਰੋਪੇ 20 ਸੇਂਮੀ x 15 ਸੇਂਮੀ ਅੰਤਰ. ਪ੍ਰਯੇਕ ਟੇਕਡੀਵਰ 1-2 ਰੋਪੇ

ਜਮਿਨੀਚੀ ਟਯਾਰੀ:

ਖ਼ੋਲ ਨਾਂਗਰਾਣੀਨੰਟਰ ਪੁਡਿੰਗ ਕਰਠੇ. ਲਾਕਠੀਚਾ ਵੇਲੀ 2-3 ਸੇਮੀ ਪਾਠੀ ਠੇਵਾ. ਮੈਦਾਨ ਚਾਂਗਲੇ ਸਮਤਲ ਕਰਾ.

ਖ਼ਰਾਂਚਾ ਡੋਸ (ਪ੍ਰਤਿ ਏਕਰ):

ਯੂਰਿਯਾ: 80- 100 ਕਿਗ੍ਰਾ. (37-46 ਕਿਗ੍ਰਾ. N), ਏਸਏਸਪੀ: 80- 100 ਕਿਗ੍ਰਾ. (13-16 ਕਿਗ੍ਰਾ. P ₂ O ₅),
ਏਮਐਪੀ: 25- 30 ਕਿਗ੍ਰਾ. (15-18 ਕਿਗ੍ਰਾ. K ₂ O)
ਨਾਡ੍ਰੋਜਨ ਕਾ ਵਿਮਾਜਿਟ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ: ਬੇਸਲ: 1/3 ਮਸ਼ਾਗਟ : 1/3 ਪੈਨਿਕਲ ਆਰੰਮ: 1/3

ਸਿੰਚਨਾਚੇ ਵੇਲਪਾਤਰ:

• ਲਾਕਠੀਨੰਟਰ 2-3 ਸੇਮੀ ਪਾਠੀ ਠੇਵਾ. ਫੁਲੇ ਯੇਡੰਪਰੰਟ 3-5 ਸੇਮੀ ਪਾਠੀ ਠੇਵਾ. ਕਾਠਠੀਚਾ 10-12 ਦਿਵਸ ਆਠੀ ਪਾਠੀ ਕਾਠਨ ਠਾਕਾ.

ਤਠਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਠਾ:

- ਪੂਰਵ-ਤਦਮਵ: ਪ੍ਰੀਟਿਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀ / ਏਕਰ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.
- ਪੋਸਟ-ਡਮਜੋਨਸ: ਬਿਸਪਾਏਰਿਥੈਕ ਸੋਡਿਯਮ @ 80-120 ਮਿਲੀ / ਏਕਰ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਵਰ.
- 30 ਟਾਰਕੇਲਾ ਹਾਤਾਨੇ ਤਠਾ ਕਾਠਠੇ.

ਕੀਡ ਆਠਿ ਰੋਗ ਕ੍ਯਵਸਥਾਪਨ:

ਕੀਟਕ:

- ਸਟੇਮ ਬੋਟਟ: ਕਲੋਰੋਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀ / ਲੀਟਰ.
- ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ: ਡਮੋਕੋਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਭੀਪੀਏਚ: ਡਿਨੋਟੋਫਚੂਟਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ / ਏਕਰ ਕਿੰਵਾ ਡਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀ / ਲੀ. ਰੋਗ:
- ਸਫ਼ੋਟ: ਟ੍ਰਾਯਸਾਯਕਲਾਜ਼ੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਸ਼ੀਥ ਕਲਾਡਟ: ਵੈਲਿਡੰਮਾਯਸਿਨ ਕਿੰਵਾ ਟ੍ਰੇਕਸਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ.
- ਬੀਏਲਬੀ: ਕਾੱਪਰ ਆਕਸਿਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਡਾਕਿਲੇਨ.

ਮੈਂਚੂਰਿਟੀ ਡਿੰਡਿਕੇਟਸ਼:

• ਪੁਠ੍ਯਗੁਚੁ ਸੋਨੇਟੀ ਪਿਵਲੇ ਹੋਤਾਟ. ਧਾਨ੍ਯ ਟਠਾਕ ਹੋਤੇ. ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਠਾਲਾ 20-22%.

ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਊਂਥਿ ਖੀਜ ਖੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨੌਜ਼ਲੇ ਐਸ.ਏ.ਕੂ./ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਲੇਲੇ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀਚਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੇਂਦ੍ਰਾਂਕਰ ਕੇਲੇਲੇਲ੍ਯਾ ਚਾਚਘ੍ਯਾਂਕਰ ਆਧਾਰਿਟ ਆਹੇ. ਮਾਤੀਚੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਾਠੀ, ਭ੍ਰੁਟਮਾਨ, ਪਿਕਾਂਚੀ ਫੇਟਪਾਲਟ ਯਾਂਗੁਲੇ ਯਾ ਜਾਤੀਚੇ ਤ੍ਯਾਦਨ ਕਰਨੂ ਠਾਕਰੇ. ਬਿਯਾਧੇ ਪੇਟਰਯਾਚੀ ਪਠ੍ਰਟ ਕ ਵਾਪਰ ਆਪਲ੍ਯਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਠਾ ਨਸਲ੍ਯਾਨੇ ਕੇਕਠ ਬਿਯਾਧ੍ਯਾਂਚਾ ਗੁਠਾਵਜੇਚੀ ਖ਼ਾਤ੍ਰੀ ਕਰਟਾ ਯੇਤੇ. ਚਾਂਗਲੇ ਪੀਕ ਖੇਘ੍ਯਾਚਾ ਮਾਗਦਿਸ਼ਨਾਸਾਠੀ ਜਕਠਕਚਾ ਏਸਏਯੂ / ਆਯਸੀਏਆਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੇਂਦ੍ਰਾਂਕਰ ਕਿੰਵਾ ਆਪਲ੍ਯਾ ਥ੍ਯਾਨਿਕ ਠਾਨ੍ਯ ਕ੍ਰੁਥੀ ਅਧਿਕਾਯਾਚਾ ਸਲ੍ਯਾ ਥ੍ਯਾ.