

Climatic Requirement:

Soil: Well-suited for loam to clay-loam soils with good organic matter. Optimum soil pH: 5.5-7.5. Avoid highly saline or alkaline soils.
Climate: Prefers warm and humid conditions. Requires continuous moisture from transplanting to flowering. Sensitive to drought at tillering and panicle initiation stages.

Sowing / Nursery Time: Kharif Season: May – July

Crop Duration: 135-145 days **Seed Rate:** 4-5 kg per acre (nursery)

Grain Type :

Long Slender , longest kernel length after cooking.

Nursery Management:

Prepare raised nursery beds with fine tilth. Maintain proper moisture and weed-free nursery. Seedlings ready in 25-30 days.

Transplanting & Spacing:

25-30 days old seedlings. 20 cm × 15 cm spacing. 1-2 seedlings per hill.

Land Preparation:

Deep ploughing followed by puddling. Maintain 2-3 cm water at transplanting. Level field well.

Fertilizer Dose (per acre):

Urea	SSP	MOP:
80-100 kg (37-46 kg N)	80-100 kg (13-16 kg P ₂ O ₅)	25-30 kg (15-18 kg K ₂ O)
Split Application of Nitrogen: Basal: 1/3 Tillering: 1/3 Panicle Initiation: 1/3		

Irrigation Schedule:

• Maintain 2-3 cm water after transplanting. Maintain 3-5 cm water till flowering.
Drain water 10-12 days before harvest.

Weed Control:

• Pre-emergence: Pretilachlor @ 600 ml/acre, 3-5 DAT.
• Post-emergence: Bispyribac Sodium @ 80-120 ml/acre at 20-25 DAT.
• Hand weeding at 30 DAT if needed.

Pest & Disease Management:**Pests:**

• Stem Borer: Chlorantraniliprole 0.3 ml/l.
• Leaf Folder: Emamectin Benzoate 0.4 g/l.
• BPH: Dinotefuran 40-60 g/acre or Imidacloprid 0.5 ml/l.

Diseases:

• Blast: Tricyclazole 0.6 g/l.
• Sheath Blight: Validamycin or Hexaconazole.
• BLB: Copper Oxchloride + Streptocycline.

Maturity Indicators:

• Panicles turn golden yellow. Grains become firm. Grain moisture 20-22%.

जलवायु आवश्यकता:

मिट्टी: अच्छे कार्बनिक पदार्थों के साथ दोमट से चिकनी-दोमट मिट्टी के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। आदर्श मिट्टी पीएच: 5.5-7.5। अत्यधिक खारी या क्षारीय मिट्टी से बचें।
जलवायु: गर्म और आर्द्र परिस्थितियों को प्राथमिकता देता है। रोपाई से लेकर फूल आने तक निरंतर नमी की आवश्यकता होती है। जुताई और पुष्पगुच्छ दीक्षा चरणों में सूखे के प्रति संवेदनशील।

बुवाई का समय: खरीफ का मौसम: मई-जुलाई

फसल की अवधि: 135-145 दिन **बीज दर:** 4-5 किग्रा प्रति एकड़ (नर्सरी)

अनाज का प्रकार:

खाना पकाने के बाद लंबी पतली, सबसे लंबी कर्नेल लंबाई।

नर्सरी प्रबंधन:

ठीक टिल्थ के साथ उठाए गए नर्सरी बेड तैयार करें। उचित नमी और खरपतवार मुक्त नर्सरी बनाए रखें। 25-30 दिनों में अंकुर तैयार हो जाते हैं।

रोपाई और स्पेसिंग:

25-30 दिन पुराने अंकुर। 20 सेमी × 15 सेमी की दूरी। प्रति पहाड़ी 1-2 अंकुर।

भूमि की तैयारी:

गहरी जुताई के बाद पोखर चलाएँ। रोपाई के समय 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। स्तर क्षेत्र अच्छी तरह से।

उर्वरक खुराक (प्रति एकड़):

यूरिया 80-100 किग्रा. (37-46 किग्रा. N), एसएसपी 80-100 किग्रा. (13-16 किग्रा. P₂O₅)

एमओपी 25-30 किग्रा. (15-18 किग्रा. K₂O)

नाइट्रोजन का विभाजित अनुप्रयोग: बेसल- 1/3, टिलरिंग: 1/3, पुष्पगुच्छ दीक्षा: 1/3

सिंचाई अनुसूची:

रोपाई के बाद 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। फूल आने तक 3-5 सेमी पानी बनाए रखें। कटाई से 10-12 दिन पहले पानी निकाल दें।

खरपतवार नियंत्रण:

• पूर्व-उदभव: प्रीटिलाक्लोर @ 600 मिली/एकड़, 3-5 दिन रोपाई के बाद।
• उदभव के बाद: बिस्पीरिबैक सोडियम @ 80-120 मिली/एकड़ 20-25 दिन रोपाई के बाद।
• 30 DAT पर हाथ से निराई।

कीट एवं रोग प्रबंधन:**कीट:**

• स्टैम बोरर: क्लोरान्त्रानिलिप्रोल 0.3 मिली/लीटर।
• लीफ फोल्डर: इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम/लीटर।
• बीपीएच: डिनोटेफ्यूरान 40-60 ग्राम/एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली/लीटर।

रोग:

• ब्लैस्ट: ट्राइसाइक्लाज़ोल 0.6 ग्राम/लीटर।
• शीथ ब्लैकट: वैलिडामाइसिन या हेक्साकोनाज़ोल।
• बीएलबी: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड + स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।

परिपक्वता संकेतक:

• पुष्पगुच्छ सुनहरे पीले हो जाते हैं। अनाज दृढ़ हो जाते हैं। अनाज की नमी 20-22%।

The recommended package of practice is based on trials done at company's research stations. As a result of varied soil type, water, weather conditions and crop rotations, the yield of this variety may vary. As method of seed sowing and usage is not in our control, hence, only seed quality can be ensured. Consult the nearest SAU/ICAR Research Stations or your local State Agriculture Officer for guidance in growing good crop.

अभ्यास का अनुशंसित पैकेज कंपनी के अनुसंधान स्टेशनों पर किए गए परीक्षणों पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के प्रकार, पानी, मौसम की स्थिति और फसल चक्र के परिणामस्वरूप, इस किस्म की उपज भिन्न हो सकती है। चूंकि बीज बोने की विधि और उपयोग हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए केवल बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। अच्छी फसल उगाने में मार्गदर्शन के लिए निकटतम एसयू/आईसीआर अनुसंधान स्टेशनों या अपने स्थानीय राज्य कृषि अधिकारी से परामर्श करें।

ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ:

ਮਿੱਟੀ-ਚੰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਣੀ-ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਮਿੱਟੀ ਪੀਐਚ: 5.5-7.5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਜਲਵਾਯੂ: ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਖਰੀਫ ਦਾ ਮੌਸਮ : ਮਈ-ਜੁਲਾਈ
ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ: 135-145 ਦਿਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 4-5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਪਨੀਰੀ)

ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ :

ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਪਤਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਲ ਲੰਬਾਈ।

ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਖੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪਨੀਰੀ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸਲਾ:

25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ x 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। 1-2 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਾੜੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:

ਭੁੰਘੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਡਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰੋ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ):

ਯੂਰੀਆ: 80-100 ਕਿਲੋ (37-46 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ), ਐਸਐਸਪੀ: 80-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (13-16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ P ₂ O ₅),
ਐਮ. ਓ. ਪੀ.: 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (15-18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇ.ਓ)
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਬੇਸਲ: 1/3 ਟਿਲਰਿੰਗ: 1/3 ਪੈਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1/3

ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ:

ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਉ।

ਖਰਤਪਰਵਾਰ:

- ਪੂਰਵ-ਉਭਰਨ: ਪ੍ਰੀਟੀਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ. I
- ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਬਿਸਪਾਈਰੀਥੈਕ ਸੋਡੀਅਮ @ 80-120 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਤੇ. I
- ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣਾ 30 ਡੀ.ਏਟੀ. I

ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ:

- ਤਣੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹਿਆਂ: ਕਲੋਰੋਟਰਾਨੀਲੀਪਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
- ਪੱਤਾ ਦਾ ਫੋਲਡਰ: ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀ।
- ਬੀ.ਪੀ.ਐਚ.: ਡਾਈਨੋਟੇਫੁਰਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ:
- ਧਮਾਕਾ: ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀ।
- ਸ਼ੀਬ ਬਲਾਈਟ: ਵੈਲੀਡਾਮਾਈਸਿਨ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਕੋਨਾਜੋਲ।
- ਬੀਐਲਬੀ: ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸੂਚਕ:

ਪੈਨਿਕਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਮੀ 20-22%।

ਹਵਾਮਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਕਰਤਾ:

ਮਾਤੀ: ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਤੇ ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਯਾ ਚਾਂਗਲ੍ਯਾ ਸੌਂਦ੍ਰਿਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਿਵਲ ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗ੍ਯ ਅਹੇ. ਡਿਫਟਨ ਮਾਤੀ ਯਾ ਪੀਏਚ: 5.5-7.5. ਜਾਸਟ ਖਾਟ ਕਰਿੰਗ ਅਲਕਥਮੀ ਮਾਤੀ ਟਾਲਾ.
ਹਵਾਮਾਨ: ਤਬਦਾਰ ਆਗਿ ਟਮਟ ਪਰਿਸ੍ਠਿਤੀਲਾ ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯ ਦੇਵੇ. ਲਾਗਣੀਪਾਸੂਨ ਤੇ ਫੁਲੇ ਯੋਧ੍ਯਾਪਰ੍ਯੰਤ ਸਤਤ ਔਲਾਗ ਆਵਾਜ਼ਕ ਅਸਤੋ. ਮਥਾਗਤ ਆਗਿ ਪੈਨਿਕਲ ਆਰੰਭ ਅਵਸ੍ਠੇਤ ਟੁਕਾਕਾਸਾਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ.

ਪੇਟਰੀਚੀ ਵੇਲ: ਖਰੀਫ ਹੁੰਗਾਮ: ਮੇ-ਜੂਲੈ
ਪੀਕ ਕਾਲਾਵਧੀ: 135-145 ਦਿਵਸ ਬਿਯਾਯੇ ਦਰ: 4-5 ਕਿਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ (ਨਰਸੀ)

ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਪ੍ਰਕਾਰ :

ਲਾਂਬ ਸਤਪਾਤਲ, ਇੰਜਵਲ੍ਯਾਨੰਤਰ ਲਾਂਬ ਕਨੌਲ ਲਾਂਬੀ .

ਨਰਸੀ ਕ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਨ:

ਬਾਰੀਕ ਟਿਲ੍ਯ ਅਸਲੇਲੇ ਤੰਚ ਨਰਸੀ ਭੇਡ ਤਯਾਰ ਕਰਾ. ਯੋਗ੍ਯ ਔਲਾਗ ਆਗਿ ਤਯਾਨੁਕੁਤ ਰੋਪਵਾਟਿਕਾ ਠੇਵਾ. 25-30 ਦਿਵਸਾਂਤ ਰੋਪੇ ਤਯਾਰ ਹੋਵਾਤ.

ਰੋਪੇ ਆਗਿ ਅੰਤਰ:

25-30 ਦਿਵਸਾਂਚੀ ਰੋਪੇ 20 ਸੇਂਮੀ x 15 ਸੇਂਮੀ ਅੰਤਰ. ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕ ਟੇਕਡੀਵਰ 1-2 ਰੋਪੇ

ਜਮਿਨੀਚੀ ਤਯਾਰੀ:

ਖੋਲ ਨਾਂਗਰਣੀਨੰਤਰ ਪੁਡਿੰਗ ਕਰਣੇ. ਲਾਗਣੀਚ੍ਯਾ ਵੇਲੀ 2-3 ਸੇਮੀ ਪਾਯੀ ਠੇਵਾ. ਮੈਦਾਨ ਚਾਂਗਲੇ ਸਮਤਲ ਕਰਾ.

ਖ਼ਤਾਂਚਾ ਤੋਸ (ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ):

ਯੂਰਿਯਾ: 80- 100 ਕਿਗ੍ਰਾ. (37-46 ਕਿਗ੍ਰਾ. N), ਏਸਏਸਪੀ: 80- 100 ਕਿਗ੍ਰਾ. (13-16 ਕਿਗ੍ਰਾ. P ₂ O ₅),
ਏਮਐਪੀ: 25- 30 ਕਿਗ੍ਰਾ. (15-18 ਕਿਗ੍ਰਾ. K ₂ O)
ਨਾਡਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾ ਵਿਭਾਜਿਤ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ: ਵੇਸਲ: 1/3 ਮਥਾਗਤ : 1/3 ਪੈਨਿਕਲ ਆਰੰਭ: 1/3

ਲਿੰਚਨਾਚੇ ਵੇਲਾਪ੍ਰਕਾਰ:

ਲਾਗਣੀਨੰਤਰ 2-3 ਸੇਮੀ ਪਾਯੀ ਠੇਵਾ. ਫੁਲੇ ਯੇਡੰਪਰ੍ਯੰਤ 3-5 ਸੇਮੀ ਪਾਯੀ ਠੇਵਾ. ਕਾਠਣੀਚ੍ਯਾ 10-12 ਦਿਵਸ ਆਧੀ ਪਾਯੀ ਕਾਠਨ ਟਾਕਾ.

ਤਯਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ:

- ਪੂਰਵ-ਤਦ੍ਯਵ: ਪ੍ਰੀਟਿਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.
- ਪੋਸਟ-ਡਿਮਯੋਨਸ: ਬਿਸਪਾਯਟਿਕੋਕ ਸੋਡਿਯਮ @ 80-120 ਮਿਲੀ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਵਰ.
- 30 ਤਾਰਯੇਲਾ ਹਾਤਾਨੇ ਤਯਾ ਕਾਠਣੇ.

ਕੀਡ ਆਗਿ ਰੋਗ ਕ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਨ:

ਕੀਟਕ:

- ਸਟੇਮ ਬੋਟਟ: ਕਲੋਰੋਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀ / ਲੀਟਰ.
- ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ: ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਬੀਪੀਏਚ: ਡਿਨੋਟੇਫੁਰਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ / ਏਕੜ ਕਿੰਗਾ ਡਿਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀ / ਲੀ. ਰੋਗ:
- ਸਫੋਟ: ਟ੍ਰਾਯਸਾਯਕਲਾਜ਼ੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਈਥ ਬਲਾਡਟ: ਵੈਲਿਡੁੰਮਾਯਸਿਨ ਕਿੰਗਾ ਏਕਸਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ.
- ਬੀਏਲਬੀ: ਕਾਪਰ ਆਕਸਿਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ.

ਮੱਚ੍ਯੂਰਿਟੀ ਡਿਕੇਟਸ਼:

ਪੁਸ਼ਪਗੁਚੁਲ ਸੋਨੇਰੀ ਪਿਵਲੇ ਹੋਵਾਤ. ਧਾਨ੍ਯ ਟਯਾਕ ਹੋਵੇ. ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਔਲਾਗਾ 20-22%.

ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਐਸ.ਏ.ਯੂ./ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਲੇਲੇ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀ ਯਾ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਕੇਲੇਲ੍ਯਾ ਚਾਚਯਾਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਹੇ. ਮਾਤੀਚੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਾਯੀ, ਸ਼ੁਰੂਮਾਨ, ਪਿਕਾਚੀ ਫੇਰਪਾਲਟ ਯਾਂਕੁਲੇ ਯਾ ਜਾਤੀਚੇ ਤਯਾਦਨ ਬਦਲੂ ਖ਼ਠਕੇ. ਬਿਯਾਯੇ ਪੇਟ੍ਰਯਾਚੀ ਪਫ਼ਰ ਵ ਯਾਦ ਆਪਲ੍ਯਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਯਾਤ ਨਸਲ੍ਯਾਨੇ ਕੇਵਲ ਬਿਯਾਯਾਚ੍ਯਾ ਗੁਯਵਚੇਚੀ ਖ਼ਾਤ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਯੇਵੇ. ਚਾਂਗਲੇ ਪੀਕ ਖੇਧ੍ਯਾਚ੍ਯਾ ਮਾਗੰਦਸ਼ਨਾਸਾਹੀ ਜਕਲ੍ਯਾ ਏਸਏਯੂ/ ਆਯਸੀਏਆਰ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦ੍ਰਾਂਕ ਕਿੰਗਾ ਆਪਲ੍ਯਾ ਸ੍ਥਾਨਿਕ ਟਾਨ੍ਯ ਕ੍ਰਬੀ ਅਧਿਕਾਯਾਚਾ ਸਲ੍ਲਾ ਯ੍ਯਾ.