

**Climatic Requirement:**

Soil: Well-suited for loam to clay-loam soils with good organic matter. Optimum soil pH: 5.5-7.5. Avoid highly saline or alkaline soils.  
Climate: Prefers warm and humid conditions. Requires continuous moisture from transplanting to flowering. Sensitive to drought at tillering and panicle initiation stages.

**Sowing / Nursery Time:** Kharif Season: May - July

**Crop Duration:** 145-150 days **Seed Rate:** 4-5 kg per acre (nursery)

**Grain Type :**

Long Slender , Strong aromatic basmati variety.

**Nursery Management:**

Prepare raised nursery beds with fine tilth. Maintain proper moisture and weed-free nursery. Seedlings ready in 25-30 days.

**Transplanting & Spacing:**

25-30 days old seedlings. 20 cm × 15 cm spacing. 1-2 seedlings per hill.

**Land Preparation:**

Deep ploughing followed by puddling. Maintain 2-3 cm water at transplanting. Level field well.

**Fertilizer Dose (per acre):**

Urea	SSP	MOP:
80-100 kg (37-46 kg N)	80-100 kg (13-16 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	25-30 kg (15-18 kg K <sub>2</sub> O)
Split Application of Nitrogen: Basal: 1/3 Tillering: 1/3 Panicle Initiation: 1/3		

**Irrigation Schedule:**

• Maintain 2-3 cm water after transplanting. Maintain 3-5 cm water till flowering. Drain water 10-12 days before harvest.

**Weed Control:**

• Pre-emergence: Pretilachlor @ 600 ml/acre, 3-5 DAT.  
• Post-emergence: Bisparybac Sodium @ 80-120 ml/acre at 20-25 DAT.  
• Hand weeding at 30 DAT if needed.

**Pest & Disease Management:****Pests:**

• Stem Borer: Chlorantraniliprole 0.3 ml/l.  
• Leaf Folder: Emamectin Benzoate 0.4 g/l.  
• BPH: Dinotefuran 40-60 g/acre or Imidacloprid 0.5 ml/l.  
Diseases:

• Blast: Tricyclazole 0.6 g/l.  
• Sheath Blight: Validamycin or Hexaconazole.  
• BLB: Copper Oxchloride + Streptocycline.

**Maturity Indicators:**

• Panicles turn golden yellow. Grains become firm. Grain moisture 20-22%.

**जलवायु आवश्यकता:**

मिट्टी: अच्छे कार्बनिक पदार्थों के साथ दोमट से चिकनी-दोमट मिट्टी के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। आदर्श मिट्टी पीएच: 5.5-7.5। अत्यधिक खारी या क्षारीय मिट्टी से बचें।  
जलवायु: गर्म और आर्द्र परिस्थितियों को प्राथमिकता देता है। रोपाई से लेकर फल आने तक निरंतर नमी की आवश्यकता होती है। जूताई और पुष्पगुच्छ दीक्षा चरणों में सूखे के प्रति संवेदनशील।

**बुवाई का समय:** खरीफ का मौसम: मई-जुलाई

**फसल की अवधि:** 145-150 दिन **बीज दर:** 4-5 किग्रा प्रति एकड़ (नर्सरी)

**अनाज का प्रकार:**

लंबे पतले, मजबूत सुगंधित बासमती किस्म।

**नर्सरी प्रबंधन:**

ठोका टिलच के साथ उठाए गए नर्सरी बेड तैयार करें। उचित नमी और खरपतवार मुक्त नर्सरी बनाए रखें। 25-30 दिनों में अंकुर तैयार हो जाते हैं।

**रोपाई और स्पेसिंग:**

25-30 दिन पुराने अंकुर। 20 सेमी × 15 सेमी की दूरी। प्रति पहाड़ी 1-2 अंकुर।

**भूमि की तैयारी:**

गहरी जुताई के बाद पोखर चलाए। रोपाई के समय 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। स्तर क्षेत्र अच्छी तरह से।

**उर्वरक खुराक (प्रति एकड़):**

यूरिया 80-100 किग्रा. (37-46 किग्रा. N) एसएसपी 80-100 किग्रा. (13-16 किग्रा. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

एमओपी 25-30 किग्रा. (15-18 किग्रा. K<sub>2</sub>O)

नाइट्रोजन का विभाजित अनुप्रयोग: बेसल- 1/3, टिलरिंग: 1/3, पुष्पगुच्छ दीक्षा: 1/3

**सिंचाई अनुसूची:**

रोपाई के बाद 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। फूल आने तक 3-5 सेमी पानी बनाए रखें। कटाई से 10-12 दिन पहले पानी निकाल दें।

**खरपतवार नियंत्रण:**

• पूर्व-उद्भव: प्रीटिलाक्लोर् @ 600 मिली/एकड़, 3-5 दिन रोपाई के बाद।  
• उद्भव के बाद: बिस्पैरिबैक सोडियम @ 80-120 मिली/एकड़ 20-25 दिन रोपाई के बाद।  
• 30 DAT पर हाथ से निराई।

**कीट एवं रोग प्रबंधन:****कीट:**

• स्टैम बोरर: क्लोरान्त्रानिलिप्रोल 0.3 मिली/लीटर।  
• लीफ फोल्डर: इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम/लीटर।  
• बीपीएच: डिनोटेफुरान 40-60 ग्राम/एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली/लीटर।  
रोग:

• ब्लैस्ट: ट्राइसाइक्लाजोल 0.6 ग्राम/लीटर।  
• शीथ ब्लाइट: वैलिडामिसिन या हेक्साकॉनाजोल।  
• बीएलबी: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड + स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।

**परिपक्वता संकेतक:**

• पुष्पगुच्छ सुनहरे पीले हो जाते हैं। अनाज दृढ़ हो जाते हैं। अनाज की नमी 20-22%।

The recommended package of practice is based on trials done at company's research stations. As a result of varied soil type, water, weather conditions and crop rotations, the yield of this variety may vary. As method of seed sowing and usage is not in our control, hence, only seed quality can be ensured. Consult the nearest SAU/ICAR Research Stations or your local State Agriculture Officer for guidance in growing good crop.

अभ्यास का अनुशंसित पैकेज कंपनी के अनुसंधान स्टेशनों पर किए गए परीक्षणों पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के प्रकार, पानी, नोसम की स्थिति और फसल चक्र के परिणामस्वरूप, इस किस्म की उपज भिन्न हो सकती है। चूंकि बीज बोने की विधि और उपयोग हमारी नियंत्रण में नहीं है, इसलिए केवल बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। अच्छी फसल उगाने में नगरदेशन के लिए निकटतम राज्य/आईसीआर अनुसंधान स्टेशनों या अपने स्थानीय राज्य कृषि अधिकारी से परामर्श करें।

**ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ:**

ਮਿੱਟੀ-ਰੇਗੇਨੈੱਟਿਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ-ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਮਿੱਟੀ ਪੀਐਚ: 5.5-7.5, ਘਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਜਲਵਾਯੂ-ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੂਣ ਅਤੇ ਪੰਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।

<b>ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ:</b> ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ : ਮਈ-ਜੁਲਾਈ	
<b>ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ:</b> 145-150 ਦਿਨ	<b>ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ:</b> 4-5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਪਨੀਰੀ)

**ਹਵਾਮਾਨਾਚੀ ਅਵਸ਼ਯਕਤਾ:**

ਮਾਤੀ-ਚਿਕਾਗਮਾਤੀ ਤੇ ਚਿਕਾਗਮਾਤੀ ਯਾ ਚਾਂਗਲਾ ਡੇਰਿਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿਕਾਗਮਾਤੀਗੀ ਯੋਗਯ ਅਫ਼ੇ, ਫ਼ਰਟਲਸ ਮਾਤੀਗੀ ਪੀਏਚ: 5.5-7.5, ਜਾਫ਼ਰ ਖ਼ਾਹਟ ਕਿੰਗਾ ਅਲਕਾਥਮੀ ਮਾਤੀ ਠਾਲਾ।

ਹਵਾਮਾਨ: ਤੁਕਦਾਰ ਆਗਿ ਟਮਟ ਪਟਿਫ਼ਿਟੀਲਾ ਪ੍ਰਾਧਾਨਯ ਵੇਦੇ, ਲਾਗਾਪਾਮੂਨ ਤੇ ਫੁਲੇ ਯੋਧਯਾਧਰਿਤ ਸ਼ਰਤ ਓਲਾਗਾ ਅਵਸ਼ਯਕ ਅਸ਼ਰਾ, ਮਠਾਗਟ ਆਗਿ ਪੌਂਕਿਕਲ ਅਟੰਅ ਅਵਸ਼ਯੇਤ ਦੁਕਲਾਸਾਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।

<b>ਪੇਰਾਣੀਚੀ ਵੇਲ਼:</b> ਖ਼ਰੀਪ ਹੰਗਮਾ: ਮੇ-ਜੂਲੇ	
<b>ਪੀਕ ਕਾਲਾਵਥੀ:</b> 145-150 ਦਿਵਸ	<b>ਬਿਯਾਯੇ ਫ਼ਰ:</b> 4-5 ਕਿੰਗਾ. ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ (ਜਲਦੀ)

**ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮ :**

ਲੰਮੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਸ਼ਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮ ਹੈ।

ਨਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਅਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਖੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਨੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪਨੀਰੀ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਲਾ:**

25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ × 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਚੂਹੀ ਰੱਖੋ। 1-2 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਾੜੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:

ਭੂਖੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੜਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰੋ। ਖਾਰੀ ਦੀ ਖੁਫ਼ਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ):

<b>ਸੂਰੀਆ:</b> 80-100 ਕਿਲੋ (37-46 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ), ਐਸਐਸਪੀ: 80-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (13-16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ),	
<b>ਐਮ. ਓ. ਪੀ.:</b> 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (15-18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲੀ)	
<b>ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:</b> ਬੇਸਲ: 1/3 ਟਿਲਡਿੰਗ: 1/3 ਪੰਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1/3	

ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਮੁਕ:

ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਕਦਾਰ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਉ।

**ਖ਼ਰਤਪਦਾਰ:**

- ਪੁਰਵ-ਉਭਰਨ: ਪ੍ਰੀਟੀਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.।
- ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਬਿਸਪਾਈਰੀਥੈਕ ਸੋਡੀਅਮ @ 80-120 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਤੇ.।
- ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣਾ 30 ਡੀ.ਏ.ਟੀ.।

**ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:**

- ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ:
- ਤਣੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹਿਆਂ: ਕਲੋਰੋਟਰਾਨੀਲੋਪਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
- ਪੱਤਾ ਦਾ ਫੋਲਡਰ: ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਕੈਲੋਰੇਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ।
- ਬੀ-ਪੀ-ਐਚ: ਡਾਈਨੋਟੋਫ਼ਰਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਫ਼ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ:
- ਪਮਾਕ: ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ।
- ਸੀਬ ਬਲਾਈਟ: ਵੈਲੀਡਾਮਾਈਸਿਨ ਨੂੰ ਹੈਕਸਾਕੋਨਾਜੋਲ।
- ਬੀ-ਐਲਬੀ: ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ

**ਪਹਿਪੱਕਤਾ ਸੂਚਕ:**

ਪੰਨਿਕਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਮੀ 20-22%।

**ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਪ੍ਰਕਾਰ :**

ਲਾਂਬ ਸਤਪਾਤਲ, ਤੀਰ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਤੀਚੀ .

ਨਸਰੀ ਕ੍ਰਬੰਧਨ:

ਗ਼ਰੀਕ ਟਿਲ੍ਯ ਅਸ਼ਲੇਲੇ ਤੇਚ ਨਸਰੀ ਭੇਡ ਤਯਾਈ ਕਰਾ. ਯੋਧਯ ਓਲਾਗ ਆਗਿ ਟਾਨਮੂਕ ਰੋਪਾਵਟਿਕਾ ਹੋਵਾ. 25-30 ਦਿਵਸਤ ਰੋਪੇ ਤਯਾਰ ਹੋਵਾਤ.

**ਰੋਪੇ ਆਗਿ ਅੰਤਰ:**

25-30 ਦਿਵਸਾਂਚੀ ਰੋਪੇ 20 ਸੇਂਮੀ × 15 ਸੇਂਮੀ ਅੰਤਰ. ਪ੍ਰਲੋਕ ਟੇਕਡੀਵਰ 1-2 ਰੋਪੇ

ਜਮੀਨੀਚੀ ਤਯਾਰੀ:

ਓਲ ਨਾਂਗਾਧੀਨੰਟਰ ਪੁੰਡਿੰਗ ਕਰਯੋ. ਲਾਗਾਧੀਚਾ ਵੇਲੀ 2-3 ਸੇਮੀ ਪਾਠੀ ਹੋਵਾ. ਜੈਦਾਨ ਚਾਂਗਲੇ ਸਮਤਲ ਕਰਾ.

**ਖ਼ਰਾਂਤਾਚਾ ਡੋਸ (ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ):**

<b>ਯੂਰਿਯਾ:</b> 80- 100 ਕਿੰਗਾ. (37-46 ਕਿੰਗਾ. N), ਏਸਏਸਪੀ: 80- 100 ਕਿੰਗਾ. (13-16 ਕਿੰਗਾ. P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ),	
<b>ਏਸਐਪੀ:</b> 25- 30 ਕਿੰਗਾ. (15-18 ਕਿੰਗਾ. K <sub>2</sub> O)	
<b>ਨਾਡਟ੍ਰਾਜਨ ਕਾ ਵਿਅਾਜਿਨਿਤ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ:</b> ਵੇਸਲ: 1/3 ਮਠਾਗਟ : 1/3 ਪੰਨਿਕਲ ਅਟੰਅ: 1/3	

**ਸਿੰਚਾਈ ਕੇ ਵੇਲਾਪ੍ਰਕਾਰ:**

ਲਾਗਾਧੀਨੰਟਰ 2-3 ਸੇਮੀ ਪਾਠੀ ਹੋਵਾਵੇ, ਫੁਲੇ ਯੋਧੰਧਰਿਤ 3-5 ਸੇਮੀ ਪਾਠੀ ਹੋਵਾ. ਕਾਫ਼ਾਣੀਚਾ 10-12 ਦਿਵਸ ਆਠੀ ਪਾਠੀ ਕਾਫ਼ੂਨ ਠਾਲਾ.

**ਤਾਗ ਨਿਯੰਤ੍ਰਾਯ:**

- ਪੁਰਵ-ਤੁਕਦਾਰ: ਪ੍ਰੀਟਿਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.
- ਪੋਸਟ-ਤੁਕਦਾਰ: ਬਿਸਪਾਯਰਿਥੈਕ ਸੋਡੀਯਮ @ 80-120 ਮਿਲੀ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਵਟ.
- 30 ਟਾਕਡੇਲਾ ਹਾਤਾਨੇ ਤਾਗ ਕਾਫ਼ਾਯੋ.

**ਕੀਡ ਆਗਿ ਰੋਗ ਕ੍ਰਬੰਧਨ:**

- ਕੀਟਕ:
- ਸਟੇਮ ਬੋਰਟ: ਕਲੋਰੋਟ੍ਰਾਨੀਲੋਪ੍ਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀ / ਲੀਟਰ.
- ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ: ਡਿਮੋਕਟਿਨ ਕੈਲੋਰੇਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਬੀਪੀਏਚ: ਡਿਨੋਟੋਫ਼ਰਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ / ਏਕੜ ਕਿੰਗਾ ਡਿਮਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀ / ਲੀ. ਰੋਗ:
- ਸਪਾਠ: ਟ੍ਰਾਯਸਾਯਕਲਾਜੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਰੀਥ ਕਲਾਡਰ: ਫੁੰਲਿਡਿੰਗਾਯਸਿਨ ਕਿੰਗਾ ਡਿਵਸਾਕੋਨਾਜੋਲ.
- ਬੀਏਲਬੀ: ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ.

**ਮੱਯੂਰਿਟੀ ਡਿੰਡਿਕੇਟਸ਼:**

ਪੁਥਯਗੁਚਲ ਸੋਨੇਰੀ ਪਿਕਵੇਲੇ ਹੋਵਾਤ. ਧਾਨ੍ਯ ਟਾਗਕ ਹੋਵੇ. ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਓਲਾਗਾ 20-22%.

ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਰਕਾ ਦਰਮਾਨ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਐਸ.ਏ.ਯੂ./ਆਈ.ਸੀ.ਏ. ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਫਾਜ਼ਲ ਕੇਲੇਲੇ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੇਲੇਲੇਲਾ ਚਾਰਯਾਂਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਫ਼ੇ. ਮਾਤੀਥ ਵਿਥਿਯ ਮਕਰ, ਪਾਠੀ, ਸ਼ਰੂਮਾਨ, ਪਿਕਾਠੀ ਖੇਰਮਾਨ ਯਾਂਕੁਲੇ ਯਾ ਮਾਤੀਥ ਤੁਕਦਾਰ ਵਰਨੁ ਖ਼ਰਕਣੇ. ਵਿਯਾਯੋ ਪੇਰਯਾਠੀ ਪਫ਼ਰਤ ਵ ਆਪ ਆਯਕਾ ਡਿਯੰਤਾਗਟ ਨਸਲ੍ਯਾਨੇ ਕੇਰਕ ਵਿਯਾਯਾਧੀਯਾ ਗੁਯਕਵੇਰੀ ਛਾਤੀ ਕਰਾਟਾ ਪੈਦੇ. ਚਾਂਗਲੇ ਪੀਕ ਖੇਧਾਯਾ ਮਾਗਦਿੰਠੀਨਾਸਾਠੀ ਨਕਰਕਯਾ ਏਕਯੂ / ਆਯਫਿਟਅਟ ਸੰਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰਾ ਕਿੰਗਾ ਆਯਕਾ ਸਯਾਨਿਕ ਠੇਧਾ ਕ੍ਰਬੀ ਅਭਿਕਾਯਾ ਖ਼ਾਲਾ ਯਾ.