

PR-114 (PADDY SEED)

नीव
सीड्स

पी आर-114 (धान बीज)

नीव
सीड्स

Climatic Requirement:

Soil: Suitable for loam to clay-loam soils with good organic matter. Optimum soil pH: 6.0-7.5. Avoid waterlogged, saline, or alkaline soils.

Climate: Prefers warm and humid climate. Requires continuous moisture from transplanting to flowering. Sensitive to drought at tillering and panicle initiation stages.

Sowing / Nursery Time: Kharif Season: June – July

Crop Duration: 135-145 days **Seed Rate:** 4-5 kg per acre (nursery)

Grain Type :

Medium-bold grains, good milling quality, non-aromatic.

Nursery Management:

Prepare raised nursery beds with fine tilth. Maintain proper moisture and weed-free nursery. Seedlings ready in 25-30 days.

Transplanting & Spacing:

25-30 days old seedlings. 20 cm × 15 cm spacing. 2 seedlings per hill.

Land Preparation:

Deep ploughing followed by puddling. Maintain 2-3 cm water at transplanting. Level the field for uniform water distribution.

Fertilizer Dose (per acre):

Urea	SSP	MOP:
90-100 kg (41-46 kg N)	80-100 kg (13-16 kg P ₂ O ₅)	25-30 kg (15-18 kg K ₂ O)
Split Application of Nitrogen: Basal: 1/3 Tillering: 1/3 Panicle Initiation: 1/3		

Irrigation Schedule:

Maintain 2-3 cm water after transplanting. Maintain 3-5 cm water till flowering. Reduce water at grain filling. Drain water 7-10 days before harvest.

Weed Control:

- Pre-emergence: Pretilachlor @ 600 ml/acre, 3-5 DAT.
- Post-emergence: Bispyribac Sodium @ 80-120 ml/acre at 20-25 DAT.
- Hand weeding at 25-30 DAT if needed.

Pest & Disease Management:

Pests:

- Stem Borer: Chlorantraniliprole 0.3 ml/l.
- Leaf Folder: Emamectin Benzoate 0.4 g/l.
- BPH: Dinotefuran 40-60 g/acre or Imidacloprid 0.5 ml/l.

Diseases:

- Blast: Tricyclazole 0.6 g/l.
- Sheath Blight: Validamycin or Hexaconazole.
- BLB: Copper Oxychloride + Streptocycline.

Maturity Indicators:

- Panicles turn golden yellow. Grains become firm and hard. Grain moisture 20-22%.

जलवायु आवश्यकता:

मिट्टी: अच्छे कार्बनिक पदार्थों के साथ दोमट से चिकनी-दोमट मिट्टी के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। आदर्श मिट्टी पीएच: 6.0-7.5। अत्यधिक खारी या क्षारीय मिट्टी से बचें। जलवायु: गर्म और आर्द्र परिस्थितियों को प्राथमिकता देता है। रोपाई से लेकर फूल आने तक निरंतर नमी की आवश्यकता होती है। जूताई और पुष्पगुच्छ दीक्षा चरणों में सूखे के प्रति संवेदनशील।

बुवाई का समय: खरीफ मौसम: जून-जुलाई

फसल की अवधि: 135-145 दिन **बीज दर:** 4-5 किग्रा प्रति एकड़ (नर्सरी)

अनाज का प्रकार:

मध्यम-बोल्ड अनाज, अच्छी मिलिंग गुणवत्ता, गैर-सुगंधित।

नर्सरी प्रबंधन:

ठीक टिलथ के साथ उठार गए नर्सरी बेड तैयार करें। उचित नमी और खरपतवार मुक्त नर्सरी बनाए रखें। 25-30 दिनों में अंकुर तैयार हो जाते हैं।

रोपाई और स्पेसिंग:

25-30 दिन पुराने अंकुर। 20 सेमी × 15 सेमी की दूरी। प्रति पहाड़ी 2 अंकुर।

भूमि की तैयारी:

गहरी जूताई के बाद पोखर चलायें। रोपाई के समय 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। समान जल वितरण के लिए खेत को समतल करें।

उर्वरक खुराक (प्रति एकड़):

यूरिया 90-100 किग्रा. (41-46 किग्रा. N), एसएसपी 80-100 किग्रा. (13-16 किग्रा. P₂O₅)

एमओपी 25-30 किग्रा. (15-18 किग्रा. K₂O)

नाइट्रोजन का विभाजित अनुप्रयोग: बेसल-1/3, टिलरिंग: 1/3, पुष्पगुच्छ दीक्षा: 1/3

सिंचाई अनुसूची:

रोपाई के बाद 2-3 सेमी पानी बनाए रखें। फूल आने तक 3-5 सेमी पानी बनाए रखें। अनाज भरने के समय पानी कम करें। कटाई से 7-10 दिन पहले पानी निकाल दें।

खरपतवार नियंत्रण:

- पूर्व-उद्भव: प्रीटिलाक्लोरो @ 600 मिली/एकड़, 3-5 दिन रोपाई के बाद।
- उद्भव के बाद: बिस्पीरिबैक सोडियम @ 80-120 मिली/एकड़ 20-25 दिन रोपाई के बाद।
- 30 DAT पर हाथ से निराई।

कीट एवं रोग प्रबंधन:

कीट:

- स्टेम बोरर: क्लोरान्त्रानिलिप्रोल 0.3 मिली/लीटर।
- लीफ फोल्डर: इमामेक्टिन बेन्जोएट 0.4 ग्राम/लीटर।
- बीपीएच: डिनोटेफ्यूरान 40-60 ग्राम/एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली/लीटर।

रोग:

- ब्लास्ट: ट्राइसाइक्लाजोल 0.6 ग्राम/लीटर।
- शीथ ब्लाइट: वैलिडामासिन या हेक्साकोनाजोल।
- बीएलबी: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड + स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।

परिपक्वता संकेतक:

- पुष्पगुच्छ सुनहरे पीले हो जाते हैं। अनाज हड़ हो जाते हैं। अनाज की नमी 20-22%।

The recommended package of practice is based on trials done at company's research stations. As a result of varied soil type, water, weather conditions and crop rotations, the yield of this variety may vary. As method of seed sowing and usage is not in our control, hence, only seed quality can be ensured. Consult the nearest SAU/ICAR Research Stations or your local State Agriculture Officer for guidance in growing good crop.

अभ्यास का अनुसंधान पैकेज कंपनी के अनुसंधान स्टेशनों पर किए गए परीक्षणों पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के प्रकार, पानी, मौसम की स्थिति और फसल चक्र के परिणामस्वरूप, इस किस्म की उपज भिन्न हो सकती है। चूंकि बीज बोने की विधि और उपयोग हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए केवल बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। अच्छी फसल उगाने में मार्गदर्शन के लिए निकटतम एसएयू/आईसीआर अनुसंधान स्टेशनों या अपने स्थानीय राज्य कृषि अधिकारी से परामर्श करें।

ਪੀ ਆਰ-114 (ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ)

ਨੀਵ
ਸੀਕਸ

ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ:

ਮਿੱਟੀ: ਚੰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਣੀ-ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਮਿੱਟੀ ਪੀਐਚ: 6.0-7.5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਜਲਵਾਯੂ: ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜਨ: ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ

ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ: 135-145 ਦਿਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 4-5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਪਨੀਰੀ)

ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ :

ਦਰਮਿਆਨੇ-ਬੋਲਡ ਅਨਾਜ, ਚੰਗੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੈਰ-ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ.

ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਖੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪਨੀਰੀ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਲ:

25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ × 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। 2 ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਾੜੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ:

ਭੁੰਘੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਡਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ):

ਯੂਰੀਆ: 90-100 ਕਿਲੋ (41-46 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ), ਐਸਐਸਪੀ: 80-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (13-16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ P₂O₅),

ਐਮ. ਓ. ਪੀ.: 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (15-18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇ.ਓ)

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਬੇਸਲ: 1/3 ਟਿਲਰਿੰਗ: 1/3 ਪੈਨਿਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1/3

ਮਿੱਚਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ:

ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਤੜਾਈ ਤੋਂ 7-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਉ।

ਖਰਤਪਰਵਾਰ:

- ਪੁਰਵ-ਉਭਰਨ: ਪ੍ਰੀਟੀਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.।
- ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਬਿਸਪਾਈਰੀਥੈਕ ਸੋਡੀਅਮ @ 80-120 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਤੇ.।
- ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣਾ 30 ਡੀ.ਏ.ਟੀ.।

ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ:

- ਤਣੇ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ: ਕਲੋਰੋਟਰਾਨੀਲੀਪਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
- ਪੱਤਾ ਦਾ ਫੋਲਡਰ: ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀ.
- ਬੀ.ਪੀ.ਐਚ.: ਡਾਈਨੋਟੇਫਰਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਿਜਾਈਆਂ:
- ਧਮਾਕਾ: ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀ.
- ਸ਼ੀਘ ਬਲਾਈਟ: ਵੈਲੀਡਾਮਾਈਸਿਨ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਕੋਨਾਜੋਲ.
- ਬੀਐਲਬੀ: ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੂਚਕ:

ਪੈਨਿਕਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਮੀ 20-22%।

ਪੀ ਆਰ-114 (ਭਾਤ ਬਿਆਏ)

ਨੀਵ
ਸੀਕਸ

ਹਵਾਮਾਨਾਚੀ ਆਵੇਸ਼ਕਤਾ:

ਸ਼ਾਦੀ: ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਤੇ ਚਿਕਨਮਾਤੀ ਯਾ ਚਾਂਗਲ੍ਯਾ ਸੋਫ਼ਿਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਿਹ ਚਿਕਨਮਾਤੀਸ਼ਾਠੀ ਯੋਗ੍ਯ ਆਏ. ਡੁਫ਼ਟਮ ਸ਼ਾਦੀਯ ਪੀਏਚ: 6.0-7.5. ਜਾਣਤ ਖ਼ਾਟ ਕਿੰਯਾ ਅਲਕਥਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟਾਕਾ.

ਹਵਾਮਾਨ: ਤਬਦਾਟ ਆਠਿ ਟਮਟ ਪਟਿਸ਼ਿਠੀਲਾ ਪ੍ਰਾਥਾਨ੍ਯ ਵੇਟੇ. ਲਾਕਠੀਪਾਸੂਨ ਟੇ ਫੁਲੇ ਯੋਧ੍ਯਾਪਰੰਟ ਸ਼ਤਤ ਆਲਾਯ ਆਵੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ਾਠੇ. ਸ਼ਾਗਤ ਆਠਿ ਪੰਨਿਕਲ ਆਰੰਠ ਅਵਸ਼ੇਟ ਟੁਫਕਾਕਾਸ਼ਾਠੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ.

ਪੇਟਠੀਚੀ ਵੇਲ: ਖ਼ਟੀਪ ਹੰਗਾਮ: ਜੂਨ-ਜੁਲੈ

ਪੀਕ ਕਾਲਾਵਠੀ: 135-145 ਦਿਵਸ ਬਿਆਏ ਟਰ: 4-5 ਕਿਯਾ. ਪ੍ਰਟਿ ਏਕੜ (ਨਸ਼ੀਟੀ)

ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਪ੍ਰਕਾਰ :

ਮਥ੍ਯਮ-ਠਲਕ ਧਾਨ੍ਯ, ਦਲਧ੍ਯਾਚਾ ਦਰ੍ਯ ਚਾਂਗਲਾ ਅਸ਼ਲੇਲਾ, ਸੁਘੰਠੀ ਨਸ਼ਲੇਲਾ.

ਨਸ਼ੀਟੀ ਕ੍ਯਵਸ਼ਠਾਪਨ:

ਬਾਗ਼ੀਕ ਟਿਲ੍ਯ ਅਸ਼ਲੇਲੇ ਚੰਚ ਨਸ਼ੀਟੀ ਵੇਡ ਟਯਾਰ ਕਰਾ. ਯੋਗ੍ਯ ਆਲਾਯ ਆਠਿ ਟਠਮੁਕ ਟੋਪਵਾਟਿਕਾ ਠੇਵਾ. 25-30 ਦਿਵਸਾਂ ਟੋਪੇ ਟਯਾਰ ਹੋਤਾਟ.

ਟੋਪੇ ਆਠਿ ਅੰਤਰ:

25-30 ਦਿਵਸਾਂ ਟੋਪੇ 20 ਸੇਂਮੀ × 15 ਸੇਂਮੀ ਅੰਤਰ. ਪ੍ਰਟ੍ਯੇਕ ਟੇਕਡੀਵਰ 2 ਟੋਪੇ.

ਜਮਿਨੀਚੀ ਟਯਾਰੀ:

ਕ਼ੋਲ ਨਾਂਗਰਠੀਨੰਟਰ ਪੁਡਿੰਗ ਕਰਠੇ. ਲਾਕਠੀਚ੍ਯਾ ਵੇਕੀ 2-3 ਸੇਂਮੀ ਪਾਠੀ ਠੇਵਾ. ਏਕਸ਼ਮਾਨ ਪਾਠੀ ਵਾਟਪਾਸ਼ਾਠੀ ਠੇਵਾ ਠੇਵਾ ਸਮਤਲਤਾ ਕਰਾ.

ਖ਼ਟਾਂਚਾ ਡੋਸ (ਪ੍ਰਟਿ ਏਕੜ):

ਯੂਰਿਯਾ: 90- 100 ਕਿਯਾ. (41-46 ਕਿਯਾ. N), ਏਸਏਸਪੀ: 80- 100 ਕਿਯਾ. (13-16 ਕਿਯਾ. P.O),

ਏਮਐਪੀ: 25- 30 ਕਿਯਾ. (15-18 ਕਿਯਾ. K.O)

ਨਾਡ੍ਰੋਜਨ ਕਾ ਵਿਯਾਜਿਟ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ: ਵੇਲ: 1/3 ਸ਼ਾਗਤ : 1/3 ਪੰਨਿਕਲ ਆਰੰਠ: 1/3

ਸਿੰਚਨਾਚੇ ਵੇਲਪ੍ਰਕਰ:

ਲਾਕਠੀਨੰਟਰ 2-3 ਸੇਂਮੀ ਪਾਠੀ ਠੇਵਾ, ਫੁਲੇ ਯੋਧ੍ਯੰਟ 3-5 ਸੇਂਮੀ ਪਾਠੀ ਠੇਵਾ. ਧਾਨ੍ਯ ਖ਼ਰਤਾਨਾ ਪਾਠੀ ਕਮੀ ਕਰਾ. ਕਾਪਠੀਚ੍ਯਾ 7-10 ਦਿਵਸ ਆਠੀ ਪਾਠੀ ਕਾਠੂਨ ਟਾਕਾ.

ਟਠ ਨਿਯੰਤ੍ਰਠ:

- ਪੂਰਵ-ਤਦ੍ਯਵ: ਪ੍ਰੀਟਿਲਾਕਲੋਰ @ 600 ਮਿਲੀ / ਏਕੜ, 3-5 ਡੀਏਟੀ.
- ਪੋਸਟ-ਡਮਜੇਂਕਸ: ਬਿਸਪਾਈਰੀਥੈਕ ਸੋਡਿਯਮ @ 80-120 ਮਿਲੀ / ਏਕੜ 20-25 ਡੀਏਟੀ ਵਰ.
- 30 ਟਾਰਕੇਲਾ ਹਾਟਾਨੇ ਟਠ ਕਾਠਠੇ.

ਕੀਡ ਆਠਿ ਟੋਗ ਕ੍ਯਵਸ਼ਠਾਪਨ:

ਕੀਟਕ:

- ਸ਼ਟੇਮ ਬੋਟਰ: ਕਲੋਰੋਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.3 ਮਿਲੀ / ਲੀਟਰ.
- ਲੀਫ ਫੋਲਡਰ: ਇਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਬੀਪੀਏਚ: ਡਿਨੋਟੇਪ੍ਰੂਟਾਨ 40-60 ਗ੍ਰਾਮ / ਏਕੜ ਕਿੰਯਾ ਡਿਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 0.5 ਮਿਲੀ / ਲੀ. ਟੋਗ:
- ਸ਼ਫੋਟ: ਟ੍ਰਾਯਸਾਯਕਲਾਡੋਲ 0.6 ਗ੍ਰਾਮ / ਲੀਟਰ.
- ਸ਼ੀਘ ਕਲਾਡਰ: ਵੈਲਿਡੋਮਾਯਿਸਿਨ ਕਿੰਯਾ ਟ੍ਰੇਕਸਾਕੋਨਾਡੋਲ.
- ਬੀਏਲਬੀ: ਕਾੱਪਰ ਆਕਸਿਕਲੋਰਾਈਡ + ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ.

ਮੱਚ੍ਯੁਰਿਟੀ ਡਿੰਡਿਕੇਟਰੰ:

ਪੁਠ੍ਯਗੁਕਲ ਸ਼ਾਨੇਟੀ ਪਿਕਲੇ ਹੋਤਾਟ. ਧਾਨ੍ਯ ਟਠਕ ਹੋਟੇ. ਧਾਨ੍ਯਾਚਾ ਆਲਾਯ 20-22%.

ਅਠਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੇਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਐਸ.ਏ.ਯੂ./ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਖੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਲੇਲੇ ਪੈਕੇਜ ਕੰਪਨੀਚ੍ਯਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੇਂਦ੍ਰਾਂਕਰ ਕੇਲੇਲ੍ਯਾ ਚਾਚਘਾਂਕਰ ਆਠਿਟ ਆਏ. ਸ਼ਾਦੀਚੇ ਵਿਵਿਠ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਾਠੀ, ਕ੍ਰਮੁਜਾਨ, ਪਿਕਾਂਚੀ ਫੇਟਪਾਲਟ ਯੰਕੁਲੇ ਯਾ ਜਾਤੀਚੇ ਤ੍ਰਯਾਦਨ ਬਦਲੂ ਠਕਟੇ. ਬਿਆਏ ਪੇਟਠ੍ਯਾਚੀ ਪਠ੍ਰਟ ਵ ਕਾਪਟ ਆਪਲ੍ਯਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਠਾਤ ਨਸ਼ਲ੍ਯਾਨੇ ਕੇਕਠ ਬਿਆਠ੍ਯਾਂਚ੍ਯਾ ਗੁਠਾਕਠੇਚੀ ਠਾੜੀ ਕਰਟਾ ਯੇਟੇ. ਚਾਂਗਲੇ ਪੀਕ ਯੋਧ੍ਯਾਚ੍ਯਾ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਨਾਸ਼ਾਠੀ ਜਕਠਕ੍ਯਾ ਏਸਏਯੂ / ਆਯਸ਼ੀਏਅਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੇਂਦ੍ਰਾਂਚਾ ਕਿੰਯਾ ਆਪਲ੍ਯਾ ਸ਼੍ਯਾਨਿਕ ਟਾਨ੍ਯ ਕ੍ਰਬੀ ਅਠਿਕਾਚਾਚਾ ਸ਼ਲ੍ਯਾ ਯਾ.